



CAHIERS DU CRPS

CENTRE DE RECHERCHE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE



Volume III, N°1

Janvier – Juin 2015

ETUDE SUR DEUX CAS CLINIQUE DE MORTALITE MATERNELLE PERI OPERATOIRE A L'HOPITAL PROVINCIAL GENERAL DE REFERENCE DE BUKAVU

Iragi M. D¹, Murhula P³, Iteke F.R.¹

1. ISTM/BKV, Section Anesthésie et Réanimation
2. HPGRB ; Département de Gynéco-Obstétrique

Auteur correspondant : Iragi M.D : donatieniragi@yahoo.fr , donatieniragi@gmail.com

Résumé

Objectif: Etudier la mortalité maternelle au cours des césariennes à l'Hôpital Provincial Général de Référence de Bukavu.

Matériel et Méthodes : Etude de deux cas cliniques de la mortalité maternelle périopératoires post césarienne survenues à l'HPGRB de janvier à juillet 2015.

Résultats : La rachianesthésie était la technique anesthésique utilisée et la Rachianesthésie totale était la principale complication notée après l'induction. Un décès était survenu directement après l'induction irréversible aux manœuvres de réanimation après une Rachianesthésie totale et un autre était survenu dans les 12 heures post opératoires après une hémorragie du post partum.

Conclusion : Au vu de ces cas cliniques, la mortalité maternelle péri opératoire reste une réalité à l'HPGRB. Une action de coordination multidisciplinaire entre les différents intervenants, chacun en ce qui le concerne, améliorerait la sécurité de la femme enceinte au cours d'une césarienne et gagnerait la maternité à moindre risque.

Mots clés : *Mortalité maternelle, péri opératoire, HPGRB de Bukavu*