



# CAHIERS DU CRPS

CENTRE DE RECHERCHE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE



Volume III, N°1

Janvier – Juin 2015

## UTILISATION DE QUELQUES METHODES CONTRACEPTIVES PAR LESFEMMES DANS LA ZONE DE SANTE D'IBANDA.

Par : Cirhuza M.A.<sup>1</sup>, Mulumeoderhwa B.A.<sup>1</sup>, Lwalemirhwe R<sup>1</sup>., Pendaceko S.<sup>1</sup>, Maneraguha K., Mukosa V<sup>1</sup>.

1. ISTM/Bukavu

Auteur correspondant : Mulumeoderhwa: [alainmb02@yahoo.com](mailto:alainmb02@yahoo.com)

### Résumé

**Objectif** : Déterminer le taux d'utilisation des méthodes contraceptives par les femmes en âge de procréer dans la zone de santé urbaine d'Ibanda.

**Matériel et méthodes** : Type d'étude transversale allant d'Avril à Juin 2014 auprès de 383 femmes en âge de procréer. L'échantillon était aléatoire simple. Les paramètres socio - démographiques tels que l'âge de la mère, la taille de ménage, le niveau des connaissances sur la planification familiale et l'utilisation des méthodes contraceptives ont été étudiées. Nous avons utilisé le logiciel Epi Info pour analyser les données, alors que le test de Chi-carré a été d'usage au seuil de 5%.

**Résultats** : une bonne partie soit 84,1% des enquêtées avaient une information sur les méthodes contraceptives, 98,1% avaient une attitude positive, 16,9 utilisaient les méthodes contraceptives. L'utilisation avait un impact sur l'espace inter gésérique (valeur-p= 0,010). Le fait d'avoir une attitude négative face aux méthodes contraceptives était associée à l'utilisation de celles-ci OR=3,61[1,89-6,6] <0,001.

**Conclusion** : Ces résultats montrent une avancée en matière de planification familiale mais cela ne veut donc pas dire que l'objectif est atteint. Une forte sensibilisation des femmes pourrait améliorer d'avantage cette situation.

**Mots clés**: Méthodes contraceptives, femmes en âge de procréer, Zone de Santé d'Ibanda.