



CAHIERS DU CRPS

CENTRE DE RECHERCHE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE



Volume IV, N°2
 Juillet– Décembre 2016
 Page : 62-77

PRISE EN CHARGE DES INFECTIONS UROGENITALES CHEZ LES FEMMES

ENCEINTES A BUKAVU. *Cas de l'Hôpital Provincial Général de Référence de Bukavu (HPGRB), Est de la République Démocratique du Congo*

Makyambe C.L.¹, Maneraguha K.F.¹, Mulinganya M.G.², Milabyo P¹

1. ISTM Bukavu, Section Sciences Infirmières
2. Hôpital Provincial Général de Référence de Bukavu

Auteur correspondant : fkajiramugabi@gmail.com / fkajiramugabi@yahoo.fr

Résumé

Objectif : *contribuer à l'amélioration de l'état de santé de la mère.*

Matériel et méthodes : *étude rétrospective sur les gestantes ayant fréquenté le Service de CPN et de Maternité de l'Hôpital Provincial Général de Référence de Bukavu pour infections urogénitales en 2015 par un recrutement systématique. Les données ont été collectées à l'aide d'une fiche d'enquête. Nous avons recouru à la revue documentaire par la consultation des dossiers des gestantes pour leur identité, leurs plaintes présentées et soins reçus ainsi que des registres de laboratoire pour les examens complémentaires demandés et réalisés. Le dépouillement des fiches après enquête a été réalisé dans Microsoft Excel. Le calcul des pourcentages, des moyennes, du khi-carré, du test Z et de la valeur de P a été réalisé par le logiciel Epi Info, version 3.5.1. Les résultats sont présentés dans des tableaux.*

Résultats : *La fréquence des infections urogénitales recensées est de 81 cas sur un total de 988 femmes reçues en CPN et à la maternité de l'HPGRB en 2015, soit 8,2%. Les prurits et les leucorrhées étaient les principales manifestations cliniques rencontrées, soit 81,5%. La plupart des grossesses avait eu une évolution normale. Le traitement de choix pour les IUG chez la majorité des gestantes (59,4%) était l'antibiothérapie de la famille des bêtalactamases (Amoxicilline).*

Conclusion : *bien que de faible prévalence, les IUG constituent un problème de pratique médicale à Bukavu et un danger permanent pour la femme enceinte. Seule la prévention et un traitement médical adéquat restent l'arme d'une lutte efficace.*

Mots-clés : *Prise en charge, Infection, Urogénitale.*