



# CAHIERS DU CRPS

*CENTRE DE RECHERCHE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE*

Volume I, N°2

Juillet– Décembre 2013



## FACTEURS INFLUENÇANT LA FAIBLE PARTICIPATION DES FEMMES ENCEINTES AU DEPISTAGE VOLONTAIRE DU VIH DANS LA ZONE DE SANTE D'IBANDA

*Kyambikwa Bisangamo<sup>1</sup> C., Kisimba Mbuze M., Mulongo Mbarambara Ph.*

<sup>1</sup>Section Techniques de Laboratoire, Institut Supérieur des Techniques Médicales de Bukavu, RD Congo

<sup>2</sup>Section Santé Communautaire, Institut Supérieur de Management de Bukavu, RD Congo

<sup>3</sup>Section Sciences Infirmières, Institut Supérieur des Techniques Médicales de Bukavu, RD Congo

Corresponding author (C. Kyambikwa Bisangamo): [celekyambis@yahoo.fr](mailto:celekyambis@yahoo.fr)

Mobile phone: +243997769126, +243843642359, +250788673301

**Résumé :** La transmission mère-enfant du VIH reste la cause principale du Sida observé chez l'enfant. L'objectif de cette étude était d'identifier les facteurs liés à la faible participation des femmes enceintes au dépistage volontaire du VIH dans la zone de santé d'Ibanda.

Une étude transversale a été menée pendant la période allant de janvier 2013 à août 2013 auprès des femmes enceintes fréquentant les sites PTME dans la zone de santé d'Ibanda. Un échantillonnage systématique a été effectué et la taille de l'échantillon était de 212 femmes.

Les facteurs tels que la résidence des femmes enceintes, la primiparité, le niveau d'instruction bas, la peur de maltraitance par les maris, la causerie éducative lors des séances des PTME et la mauvaise qualité du counseling influencent la faible participation des femmes enceintes au dépistage volontaire du VIH.

**Mots clés :** Facteurs, Femmes enceintes, dépistage volontaire, VIH