



# CAHIERS DU CRPS

*CENTRE DE RECHERCHE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE*

Volume I, N°2

Juillet– Décembre 2013



**FACTEURS INFLUENÇANT LA FAIBLE PARTICIPATION DES FEMMES ENCEINTES AU DEPISTAGE VOLONTAIRE  
DU VIH DANS LA ZONE DE SANTE D'IBANDA**

**ENFANTS DANS LA RUE DE BUKAVU ET QUELQUES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES**

Wakeka Kabyuma Cl<sup>1</sup>, Kyambikwa Bisangamo C<sup>1</sup>, Mulongo Mbarambara Ph<sup>2</sup>, Mudimba Lamata M<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>Section Techniques de Laboratoire, <sup>2</sup>Section Sciences Infirmières, <sup>3</sup>Section Santé Publique, ISTM-Bukavu, RD Congo.

Auteur correspondant : Cl. Wakeka Kabyuma<sup>1</sup>

Téléphone portable : +243 813178489. E-mail : [ckabyuma@yahoo.com](mailto:ckabyuma@yahoo.com) / [wclaude@ymail.com](mailto:wclaude@ymail.com)

## **Résumé :**

L'objectif de cette enquête était de décrire la situation sanitaire des enfants de la rue de la ville de Bukavu face à quelques pathologies infectieuses et parasitaires dans le but de contribuer à l'amélioration de leur état sanitaire.

Une étude transversale était conduite de juillet à octobre 2006 à Bukavu pour comprendre la situation des enfants en rupture familiale communément appelés « Enfants de la rue » face aux infections. Pour cela 121 enfants ont été sélectionnés et une interview a été réalisée selon un questionnaire préétabli.

Comme résultats, nous avons observé que l'âge moyen de ces enfants était de 15,3 ans  $\pm$  2,9 ; 99,2% étaient de sexe masculin, deux tiers de ces enfants n'avaient pas terminé l'école primaire et un tiers était analphabète. Presque la moitié des enfants enquêtés souffraient des parasitoses intestinales dont les plus courantes étaient l'ascaridiose, la trichocéphalose et l'amibiase. Le paludisme était à 12,4% et la salmonellose à 8,3%. L'infection à VIH/sida était à 36% pour les enfants qui ont accepté de faire volontairement le test de dépistage du VIH.

Cette enquête retient un taux élevé des parasitoses. Le paludisme, la salmonellose et l'infection au VIH y sont forts représentés. Une éducation préventive apparaît comme une alternative pour améliorer les conditions sanitaires des enfants en rupture familiale.

**Mots clés :** *Enfants, rue et infections*