



CAHIERS DU CRPS

CENTRE DE RECHERCHE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE

Volume I, N°2

Juillet– Décembre 2013



FACTEURS FAVORISANT LA RECHUTE DES MALADES MENTAUX SUIVIS AU CENTRE PSYCHIATRIQUE SOSAME DE BUKAVU

C. Matabaro Mukembanyi¹, C. Kyambikwa Bisangamo², E. Biringanine Mushagalusa¹, J. Shabani Malekezi³

¹Section Sciences Infirmières,

²Section Techniques de Laboratoire, ³Section EASI, I.S.T.M./Bukavu, RD Congo

Corresponding author: C.Kyambikwa Bisangamo: celekyambis@yahoo.fr

Mobile phone: +243997769126.

Résumé : Dans la région de Grands Lacs et en particulier à l'Est de la RD du Congo, le taux des problèmes mentaux est élevé ; 15 millions de congolais sont touchés par ces problèmes. Le cycle de rechute aboutit à une crise grave qui rend la personne totalement incapable de fonctionner pendant une certaine période de temps, voire la détérioration de tous les domaines de sa vie.

L'objectif de cette étude était de déterminer les facteurs influençant la rechute des malades mentaux suivis au Centre Psychiatrique SOSAME de Bukavu. Nous avons mené une étude transversale auprès des malades mentaux suivis au Centre SOSAME au cours de la période allant de décembre 2011 jusqu'en mars 2012. Un échantillon des 89 malades mentaux a été enquêté. Nos données ont été saisies et traitées au moyen des logiciels Excel et Epi Info version 3.4.1. Les résultats de notre enquête ont montré que l'âge moyen des malades mentaux enquêtés était de 36,4 ans, les hommes étaient plus nombreux que les femmes. Pour l'état civil, 60,7 % sont des séparés ; 60,7 % œuvrent dans le secteur privé. La majorité des patients provenaient de la commune de Kadutu. Le taux de rechutes est de 55 %. Nous avons noté une différence statistiquement significative entre la rechute et les variables étudiées ci-dessous : la profession de nos enquêtés, la fréquence d'hospitalisation, l'encadrement après hospitalisation et les séances éducationnelles. Les résultats de l'analyse multivariée par la régression logistique nous ont montré que seul le non encadrement des patients après hospitalisation était un facteur influençant la rechute.

Mots clés : Facteurs, Rechute, Malades mentaux